



PERÚ:

Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2022

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Marzo 2023

Contenido



Desnutrición, anemia y consumo de hierro



Inmunizaciones y control de crecimiento y desarrollo



Enfermedades prevalentes



Atención materno neonatal




Violencia contra la mujer



Resumen metodológico






Desnutrición, anemia y consumo de hierro

- Desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años.*
- Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad.*
- Consumo de suplemento de hierro en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad en los últimos 7 días.*
- Menores de 6 meses de edad con lactancia materna.*
- Niñas y niños con incidencia de bajo peso al nacer.*

MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2009 – 2022

Patrón de referencia OMS

(Porcentaje)



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2009 – 2022


Patrón de referencia OMS

(Porcentaje)


Área de Residencia



Región natural




Dominios geográficos



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2021 Y 2022



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2021 Y 2022


Patrón de referencia OMS

(Porcentaje)

Nivel de educación de la madre




Quintil de riqueza



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2009 - 2022

(Porcentaje)




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2009 - 2022

(Porcentaje)


Área de Residencia



Región natural




Dominios geográficos



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2021 Y 2022

(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2021 Y 2022

(Porcentaje)


Nivel de educación de la madre



Grupo de edades en meses



Tipo de anemia




() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2009 – 2022

(Porcentaje)




Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2022

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2021 Y 2022



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.



2/ Comprende las provincias: Barranta, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, 2021 – 2022

(Porcentaje)



Nota: Se indaga el consumo de suplemento de hierro en los últimos 7 días anteriores a la entrevista.


1/ Comprende hierro en gomitas, jarabe multivitamínico que contiene hierro, entre otros.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA, 2009 – 2022

(Porcentaje)




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA, 2009 – 2022

(Porcentaje)


Área de Residencia



Nivel de educación de la madre




Quintil de riqueza



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

NIÑAS Y NIÑOS CON INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER (< 2,5 Kg), 2009 – 2022 (Porcentaje)






Inmunizaciones y Control de Crecimiento y Desarrollo

- Vacunas de acuerdo a su edad en menores de 12 meses.*
- Controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad en menores de 36 meses.*

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD, 2014 – 2022 (Porcentaje)

Según Esquema de vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP ^{1/}



Nota: Se transcriben las vacunas y fechas de administración del carné de atención integral de salud del niño y en los casos que no muestre se registra información de la madre por recordación.


1/ Vacunas de acuerdo a su edad incluye 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de Polio, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD, 2021 Y 2022

(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


* Diferencia significativa (p < 0.10); ** Diferencia altamente significativa (p < 0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, 2017 – 2022

(Porcentaje)

Según NST N°137-MINSA/2017/DGIESP



Nota: Se indaga con la madre por el número de controles de crecimiento que tuvo el niño desde su nacimiento, validándose con el camé de atención integral de salud del niño.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar




Enfermedades Prevalentes

- ❑ *Infecciones Respiratorias Aguda (IRA) en menores de 36 meses de edad.*
- ❑ *Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 meses de edad.*

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), 2009 – 2022

(Porcentaje)




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), 2021 – 2022

(Porcentaje)

Región natural



Quintil de riqueza




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA), 2009 – 2022

(Porcentaje)





* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE TUVIERON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA), 2021 –2022

(Porcentaje)



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.




Atención materno neonatal

- Control prenatal*
- Parto institucional*
- Gestantes que consumieron suplemento de hierro*
- Nacimientos por cesárea*
- Planificación familiar*

GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIÓ SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, 2009 - 2022

(Porcentaje)




* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES, 2009 - 2022

(Porcentaje)




Nota: En la encuesta se le pregunta a la entrevistada cuantos controles prenatales tuvo durante su embarazo, sobre el último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2022 (Porcentaje)




Nota: En la encuesta se le pregunta a la entrevistada quien le atendió el parto y donde dio a luz.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, 2009 – 2022

(Porcentaje)




Nota: Se indaga en la madre por el consumo de hierro en pastilla, jarabe o en inyección de su último nacimiento

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2009 – 2022 (Porcentaje)



* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, 2021 Y 2022

(Porcentaje)

2021

2022

Diferencia en puntos porcentuales
2022 /2021




1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

* Diferencia significativa (p < 0.10); ** Diferencia altamente significativa (p < 0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).


MUJERES EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2022 (Porcentaje)



Nota: En la encuesta se pregunta si la mujer actualmente está haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar el embarazo . Así mismo se pregunta por el uso de métodos (esterilización masculina y femenina, píldora, DIU, inyección, implante, preservativo, espumas, MELA, abstinencia periódica, alguna vez .

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

MUJERES EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 2009 – 2022 (Porcentaje)



Nota: En la encuesta se pregunta si la mujer actualmente está haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar el embarazo . Así mismo se pregunta por el uso de métodos (esterilización masculina y femenina, píldora, DIU, inyección, implante, preservativo, espumas, MELA, abstinencia periódica, alguna vez .

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar




Violencia contra la mujer

- Violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero*
- Violencia ejercida en los últimos 12 meses por el esposo o compañero*

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2009 – 2022

(Porcentaje)




a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2021 – 2022

(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


* Diferencia significativa (p < 0.10); ** Diferencia altamente significativa (p < 0.05); *** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar


VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2021 – 2022

(Porcentaje)

Región natural



Tipo de violencia 1/




1/Respuesta Múltiple

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2018 – 2022

(Porcentaje)




a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS, EJERCIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, 2021 – 2022

(Porcentaje)



1/Respuesta Múltiple

* Diferencia significativa ($p < 0.10$); ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$); *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.010$).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



RESUMEN METODOLÓGICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR, 2022



COBERTURA GEOGRÁFICA

A Nivel nacional, en las 24 regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao
Periodo: Enero-Diciembre 2022



MARCO MUESTRAL

Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso previo al inicio de la encuesta.



NIVELES DE INFERENCIA

- ✓ Nacional
- ✓ Área de residencia: Urbano y Rural
- ✓ Región natural : Lima Metropolitana, resto Costa, Sierra y Selva
- ✓ Regional



POBLACIÓN OBJETIVO

- ✓ Los hogares particulares, sus miembros: residentes habituales y los que pernoctaron la noche anterior.
- ✓ Mujeres de 12 a 49 años
- ✓ Niñas/os menores de 5 años
- ✓ Personas de 15 años a más
- ✓ Niñas y niños menores de 12 años



TAMAÑO DE LA MUESTRA ^{1/}

36 650 viviendas en
3 245 conglomerados



TIPO DE CUESTIONARIO

Entrevista directa a través de dispositivos móviles (Tablet)

- ✓ Cuestionario del Hogar (Jefe/a del hogar o persona de 18 y más años de edad)
- ✓ Cuestionario Individual (Mujeres de 12 a 49 años de edad)
- ✓ Cuestionario de Salud (Personas de 15 años y más de edad)

^{1/}La muestra anual programada para el año 2022 fue de 36 760 viviendas y 3 254 conglomerados, por problemas de acceso y conflictos sociales se ejecuto el 99.7%



www.inei.gob.pe
infoinei@inei.gob.pe

