



Perú:
**Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar**
ENDES 2022
Nacional y Departamental



Dirección General

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Peter José Abad Altamirano

Subjefe de Estadística

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Dirección y Supervisión

Jose Luis Huertas Chumbes

Director Nacional de Censos y Encuestas (e)

Nancy Hidalgo Calle

Directora

Dirección Nacional de Censos y Encuestas

Jefe de Proyecto

Karen Romero Jares

Colaboración especial

Elva Davila Tanco

Directora

Dirección Técnica de Demográfica e Indicadores Sociales

Walter Mendoza de Souza

Analista de Programa en Población y Desarrollo

Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA

Procesamiento de datos

Carlos Pure Jurado

Concepción Borda Quispe

Diana Paico Díaz

Jorge Santamaria Vidaurre

Luz Piscocoya Jurupe

Manuel Cochachin Melgarejo

William Risco Guevara

Edición, análisis y/o revisión

Flor Suárez Rodríguez

Cecil Munguia Garcia

Concepción Borda Quispe

Jeferson Fernandez Guillen

Jorge Santamaria Vidaurre

Juan Torres Pizarro

Luz Piscocoya Jurupe

Manuel Cóchachin Melgarejo

Nataly Gonzales Pinto

Rosa Chacate Gonzales

Rosa Huarcaya Ruiz

Sandy Huanca Flores

William Risco Guevara

Elaboración de Mapas temáticos

Lourdes Huertas Rosales

Diagramación

Gladys Alvarez Moreno

Pedro Reto Nuñez

Diseño de Carátula:

Ana Quispe Saavedra

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ

Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Mayo 2023

Presentación

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES es una de las investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sus principales resultados se presentan en el Documento **“Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental”**, que se pone a disposición de autoridades del gobierno, entidades públicas, centros de investigación, universidades y público en general.

El presente informe fue elaborado con la información recopilada en el Cuestionario del Hogar y Cuestionario Individual de la ENDES, dicha encuesta se aplicó durante los meses de enero a diciembre del 2022. El número de viviendas seleccionada fue 36 650 de las cuales 35 287 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 38 105 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 35 787 entrevistas completas. La muestra seleccionada representa la totalidad de la población del país. Es importante resaltar que el análisis del presente documento, está basado principalmente en la población de mujeres de 15 a 49 años de edad, no obstante, en algunos indicadores principales se ha incluido a las mujeres de 12 a 14 años de edad.

El presente documento contiene doce capítulos y tres apéndices. En cada capítulo se presentan gráficos de los indicadores principales con sus respectivos análisis descriptivos. Se trata así, de las características de las viviendas y de la población, el nivel de fecundidad, la situación de la salud reproductiva y preferencias de fecundidad, asimismo la atención durante el embarazo, parto y postparto. También, destacan aspectos relacionados con las inmunizaciones de niñas y niños, cuya metodología del cálculo- de los indicadores de vacunas- está actualizada según lo plasmado en el Esquema Nacional de Vacunación vigente (RM N°719-2018/MINSA, que aprueba la NTS n°141-MINSA/2018/DGIESP). En el noveno capítulo, se analiza aspectos relacionados a la lactancia, nutrición de niñas, niños y nutrición de mujeres, así como el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Igualmente se analiza el conocimiento de las mujeres en edad fértil sobre el VIH/SIDA y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El penúltimo capítulo aborda los episodios de violencia familiar contra las mujeres, niñas y niños. El último capítulo muestra los indicadores contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los Apéndices A, B, y C, se refieren respectivamente al diseño y cobertura de la muestra; errores de muestreo y calidad de la información.

Hacemos hincapié que la forma de cálculo de todos los indicadores presentados por la ENDES fue validada, en reuniones de trabajo, por el sector pertinente.

Al final del Informe, se incluye en forma magnética un Anexo Estadístico con todos los cuadros o tablas que siempre han conformado el cuerpo del Informe principal de la ENDES, que comprenden cruces por nivel de educación, quintil de riqueza, departamento, entre otros.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ratifica su especial agradecimiento a los hogares peruanos, por brindar la información y su importante colaboración durante el desarrollo de la entrevista. Asimismo, a las instituciones involucradas, especialmente al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), por su apoyo para la ejecución de la investigación. Al trabajo desplegado por las entrevistadoras, supervisoras y personal de la encuesta, que, sin duda, ha sido fundamental en la obtención de datos de calidad.

Lima, mayo 2023

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Contenido

	Pág.
PRESENTACIÓN	3
LISTA DE GRÁFICOS	11
LISTA DE MAPAS	21
PRINCIPALES INDICADORES	25
RESUMEN EJECUTIVO	35
CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN	55
1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOS HOGARES	57
Servicios básicos en las viviendas	57
Servicios de electricidad	57
Fuente de agua para beber	58
Servicio sanitario	59
Material del piso	61
Hacinamiento	62
Disponibilidad de bienes de consumo duradero	63
Bienes de consumo duradero	63
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.....	64
Población por ámbito de residencia	64
Composición de población total por sexo, edad	65
Orfandad en menores de 15 años de edad según edad y región natural	65
Condición de residencia familiar de menores de 15 años de edad	66
Nivel de educación	67
Mediana de los años de estudio	67
Asistencia escolar por edad	68
CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES	71
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	73
Distribución por grupos de edad.....	73
Indicadores de etnicidad	74
2.2 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS ENTREVISTADAS	74
Mediana de años de estudio.....	75

2.3	RAZON PRINCIPAL PARA NO CONTINUAR ESTUDIANDO – MUJERES DE 24 AÑOS DE EDAD O MENOS	75
	Razones para dejar de estudiar según área de residencia	75
2.4	ACCESO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD	79
2.5	CARACTERISTICAS LABORALES DE LAS ENTREVISTADAS	80
	Empleo y tipo de ocupación de las mujeres entrevistadas.....	80
	Etnicidad.....	81
	Grupo de ocupaciones por área de residencia.....	82
	Tipo de empleador y formas de remuneración	83
2.6	COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD	84
	Cobertura de seguros de salud según ámbito de residencia.....	84
CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD		89
3.1	NIVELES, TENDENCIAS Y DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD.....	91
	Evolución de fecundidad	92
	Niveles de fecundidad.....	92
	Etnicidad.....	94
	Tasas específicas de fecundidad.....	97
3.2	INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS	97
	Etnicidad.....	99
3.3	EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DE LA PRIMERA HIJA Y/O HIJO	99
	Edad al primer nacimiento.....	99
	Etnicidad.....	100
3.4	FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES.....	101
	Embarazo y maternidad de adolescentes de 15 a 19 años de edad.....	101
	Embarazo y maternidad de adolescentes de 12 a 17 años de edad.....	102
CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR		103
4.1	PREVALENCIA DEL USO DE MÉTODOS	105
	Uso actual de métodos anticonceptivos.....	105
	Métodos modernos específicos.....	108
	Uso de Métodos tradicionales específicos	113
4.2	MUJERES USUARIAS DE ESTERILIZACIÓN.....	113
4.3	FUENTE DE SUMINISTRO	114
4.4	DISCONTINUACIÓN DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	115
	Tasas de discontinuación del uso de anticonceptivos durante el primer año.....	115
	Diálogo de planificación familiar entre parejas	116
CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD		117
5.1	ESTADO CONYUGAL ACTUAL.....	119
	Estado conyugal actual de las mujeres de 15 a 49 años de edad, según característica seleccionada	119

	Etnicidad	121
	Lengua materna	121
5.2	EDAD A LA PRIMERA UNIÓN CONYUGAL.....	122
	Edad mediana a la primera unión, según ámbito geográfico	122
	Etnicidad	125
5.3	EDAD A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	126
	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres de 25 a 49 años de edad.....	126
	Etnicidad	129
	Uso del condón en mujeres de 12 a 24 años de edad en su primera relación sexual.....	129
5.4	INFERTILIDAD POSTPARTO.....	130
	Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad postparto.....	131
CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD		133
6.1	EL DESEO DE TENER MÁS HIJAS Y/O HIJOS	135
	Preferencia de fecundidad, según área de residencia.....	136
	Deseo de tener (más) hijas o hijos, según área de residencia	136
	Etnicidad	137
6.2	LA NECESIDAD INSATISFECHA Y LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....	138
	La necesidad insatisfecha de planificación familiar	138
	Necesidad insatisfecha para limitar	138
	Necesidad insatisfecha para espaciar.....	138
	La demanda total de planificación familiar	138
	Necesidad insatisfecha y demanda total de planificación familiar	139
	Etnicidad	141
6.3	PLANIFICACIÓN DE LA FECUNDIDAD	142
	Planificación de la fecundidad, según orden de nacimiento	142
6.4	TASA DE FECUNDIDAD DESEADA Y OBSERVADA.....	143
CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA		149
7.1	ATENCIÓN PRENATAL	151
	Número de atenciones prenatales	154
	Meses de embarazo a la primera atención prenatal	155
	Actividades de la atención prenatal	156
	Vacunación antitetánica durante la gestación	156
7.2	ATENCIÓN DEL PARTO	160
	Persona que participó el parto.....	160
7.3	PARTO INSTITUCIONAL	163
7.4	NACIMIENTO POR CESÁREA	164
7.5	CUIDADO POSTNATAL DE LAS MADRES	169
	Momento del primer control postnatal	169
	Persona que realizó la atención postnatal	173

Momento del control postnatal para el nacimiento más reciente de los cinco años precedentes a la encuesta, que no ocurrió en un establecimiento de salud.....	173
Persona que realizó el primer control postnatal para el nacimiento más reciente que no ocurrió en un establecimiento de salud	174
Barreras en el acceso a servicios de salud	175

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 177

8.1 PESO AL NACER.....	179
8.2 VACUNACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS.....	183
Vacunación en niñas y niños menores de 12 meses de edad	183
Vacunación en niñas y niños menores de 24 meses de edad	184
Vacunas básicas completas para menores de 36 meses	191
8.3 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).....	192
Búsqueda de tratamiento.....	194
8.4 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA).....	195
Administración de líquidos y sólidos durante la diarrea	201
Conocimiento sobre Sales de Rehidratación Oral (SRO).....	201
Eliminación de las deposiciones de las niñas y niños.....	202

CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) DE NIÑAS Y NIÑOS Y NUTRICION DE MUJERES 203

9.1 INICIACIÓN DE LA LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA.....	205
9.2 LACTANCIA MATERNA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS MESES DE EDAD	207
Lactancia de las niñas o niños menores de seis meses de edad	207
9.3 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	208
Alimentos ricos en vitamina “A” y hierro	211
9.4 INGESTA DE MICRONUTRIENTES.....	211
Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro.....	211
Etnicidad y consumo de hierro en los últimos 7 días	212
9.5 ANEMIA EN NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES	215
Métodos	216
Anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad	216
Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad	217
Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad	218
Etnicidad y anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad.....	224
9.6 NUTRICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS.....	227
Uso del patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud.....	227
Desnutrición crónica.....	227
Desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de edad	228
9.7 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN NIÑAS Y NIÑOS.....	231

9.8	NUTRICION DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL	234
	Estatura de las mujeres en edad fértil	234
	Estatura promedio de las mujeres en edad fértil	235
	Peso y masa corporal de las mujeres	235
	Estado nutricional de las mujeres en edad fértil según índice de masa corporal (IMC)	236
CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS		237
10.1	CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR	239
	Etnicidad	243
10.2	CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH	243
	Etnicidad	244
10.3	CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)	245
	Conocimiento de las ITS	245
	Etnicidad	249
10.4	USO DEL CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN	249
	Uso de condón según tipo de compañero	249
CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS		251
11.1	VIOLENCIA FAMILIAR Y FORMAS	253
	Violencia ejercida alguna vez	253
	Etnicidad y violencia Psicológica y/o verbal	257
	Violencia física y/o sexual ejercida contra la mujer en los últimos 12 meses	258
	Resultados de la violencia física	263
	Violencia física ejercida por el esposo o compañero, bajo los efectos del licor/drogas o ambas	263
11.2	SOLICITUD DE AYUDA Y DENUNCIA DEL MALTRATO	264
	Búsqueda de ayuda en personas cercanas	264
	Búsqueda de ayuda en alguna institución	267
	Razones por las cuales no buscaron ayuda cuando fueron maltratadas	
	Físicamente	267
11.3	VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD	268
	Personas que corrigen en el hogar	269
	Principales formas que utilizan el padre y la madre para corregir a sus Hijas e hijos de 1 a 5 años de edad	269
CAPÍTULO 12: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		271
12.1	NUTRICIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS	273
	Desnutrición crónica	273
12.2	ATENCIÓN DEL PARTO	276
	Mortalidad materna	276
	Partos con asistencia de personal de salud calificado	276

12.3	PREVALENCIA DE USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS	280
	Uso actual de métodos anticonceptivos modernos	280
	Fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad.....	281
12.4	VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL.....	282
	Mujeres que han sufrido violencia física y sexual.....	282
12.5	CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO.....	283
	Personas con trastornos por consumo de alcohol	283
	Personas que fuman diariamente cigarrillos	285
APÉNDICE A		287
APÉNDICE B		301
APÉNDICE C		345
ANEXO		355
LISTA DE CUADROS		355

Lista de Gráficos

	Pág.
CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN	55
Gráfico 1.1 Disponibilidad de luz eléctrica	58
Gráfico 1.2 Disponibilidad de luz eléctrica, según área de residencia	58
Gráfico 1.3 Fuente de agua para beber por red pública, según área de residencia	59
Gráfico 1.4 Fuente de agua para beber por red pública 1/, según área de residencia	59
Gráfico 1.5 Viviendas con servicio sanitario 1/, conectado a red pública.....	60
Gráfico 1.6 Viviendas con servicio sanitario 1/, según área de residencia.....	60
Gráfico 1.7 Acceso a servicio sanitario de las viviendas, según área de residencia.....	61
Gráfico 1.8 Material predominante del piso de las viviendas.....	61
Gráfico 1.9 Material predominante del piso de las viviendas, según área de residencia	62
Gráfico 1.10 Proporción de hogares hacinados, según ámbito geográfico	62
Gráfico 1.11 Bienes de consumo duradero del hogar	63
Gráfico 1.12 Bienes de consumo duradero del hogar, según área de residencia	64
Gráfico 1.13 Distribución de la población, según ámbito geográfico	64
Gráfico 1.14 Composición de la población por sexo, según grupo de edad	65
Gráfico 1.15 Orfandad en menores de 15 años de edad, según edad	66
Gráfico 1.16 Orfandad en menores de 15 años de edad, según región natural.....	66
Gráfico 1.17 Mediana de años de educación de la población de 6 años y más, según sexo	67
Gráfico 1.18 Mediana de años de educación de la población de 6 y más, por sexo, según área de residencia.....	68
Gráfico 1.19 Asistencia escolar de la población de 6 a 24 años de edad por sexo, según área de residencia.....	69
 CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES.....	 71
Gráfico 2.1 Distribución de las mujeres en edad fértil de 12 a 49 años de edad.....	73
Gráfico 2.2 Distribución de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según Autoidentificación étnica y lengua materna.....	74
Gráfico 2.3 Mediana de años de educación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia	75
Gráfico 2.4 Razón principal de las mujeres de 12 a 24 años de edad para no continuar estudiando, según área de residencia.....	76
Gráfico 2.5 Razón principal de las mujeres de 15 a 24 años de edad para no continuar estudiando, según área de residencia.....	76
Gráfico 2.6 Acceso de las mujeres de 15 a 24 años de edad a los medios masivos de comunicación.....	79

Gráfico 2.7	Acceso de las mujeres de 15 a 24 años de edad a los medios masivos de comunicación, según área de residencia.....	80
Gráfico 2.8	Condición de trabajo en los últimos 12 meses de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Según área de residencia y región natural	81
Gráfico 2.9	Condición de trabajo en los últimos 12 meses de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, Según autoidentificación étnica y lengua materna	82
Gráfico 2.10	Grupo de ocupación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad	82
Gráfico 2.11	Grupo de ocupación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	83
Gráfico 2.12	Tipos de empleador y formas de remuneraciones de las mujeres de 15 a 49 años de edad que trabajan, según tipo de ocupación agrícola y no agrícola.....	84
Gráfico 2.13	Cobertura de seguros de salud de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	85

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD..... 89

Gráfico 3.1	Tasa global de fecundidad.....	93
Gráfico 3.2	Tasa global de fecundidad, según área de residencia	93
Gráfico 3.3	Tasa global de fecundidad, según característica seleccionada	94
Gráfico 3.4	Tasa global de fecundidad, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	94
Gráfico 3.5	Tasas específicas de fecundidad, según área de residencia	97
Gráfico 3.6	Intervalo entre nacimientos de orden dos o más en los cinco años anteriores a la encuesta, según número de meses desde el nacimiento anterior	98
Gráfico 3.7	Mediana del intervalo entre nacimientos de orden dos o más en los cinco años anteriores a la encuesta, según sobrevivencia del nacimiento anterior y nivel de educación.....	98
Gráfico 3.8	Mediana del Intervalo entre nacimientos de orden dos o más en los cinco años anteriores a la encuesta, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	99
Gráfico 3.9	Mediana de edad al primer nacimiento entre mujeres de 25 - 49 años, según nivel de educación y región natural	100
Gráfico 3.10	Mediana de edad al primer nacimiento entre mujeres de 25 - 49 años, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	100
Gráfico 3.11	Adolescentes de 15 a 19 años de edad que son madres o que están embarazadas por primera vez, según característica seleccionada	102
Gráfico 3.12	Adolescentes de 12 a 17 años de edad que son madres o que están embarazadas por primera vez.....	102

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR..... 103

Gráfico 4.1	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método de planificación familiar.....	106
Gráfico 4.2	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método de planificación familiar, según área de residencia	106

Gráfico 4.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método moderno de planificación familiar, según área de residencia.....	107
Gráfico 4.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método tradicional de planificación familiar, según área de residencia.....	107
Gráfico 4.5	Métodos modernos más usados por las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas	108
Gráfico 4.6	Métodos modernos más usados por las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas, según área de residencia.....	108
Gráfico 4.7	Métodos tradicionales más usados por las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas y conocimientos del periodo fértil.....	113
Gráfico 4.8	Mujeres de 15 a 49 años de edad esterilizadas, según grupos de edad al momento de la esterilización	113
Gráfico 4.9	Fuente de suministro de métodos modernos de las usuarias actuales (mujeres de 15 a 49 años de edad	114
Gráfico 4.10	Métodos específicos suministrados por el sector público o privado a las usuarias actuales	114
Gráfico 4.11	Tasa de discontinuación de métodos anticonceptivos dentro de los 12 meses después de comenzar a usarlo, según motivo de discontinuación	115
Gráfico 4.12	Tasa de discontinuación de métodos anticonceptivos dentro de los 12 meses después de comenzar a usarlo, según método discontinuado	116
Gráfico 4.13	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas, por frecuencia de diálogo sobre planificación familiar (PF) con el esposo o compañero durante el último año.....	116
CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD.....		117
Gráfico 5.1	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad.....	119
Gráfico 5.2	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia	120
Gráfico 5.3	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según región natural.....	120
Gráfico 5.4	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según autoidentificación étnica	121
Gráfico 5.5	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad según lengua materna.....	121
Gráfico 5.6	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad	122
Gráfico 5.7	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad, según ámbito geográfico	125
Gráfico 5.8	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna	125
Gráfico 5.9	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad.....	126
Gráfico 5.10	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según ámbito geográfico	126

Gráfico 5.11	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna	129
Gráfico 5.12	Mujeres de 12 a 24 años de edad que usaron condón en su primera relación sexual, según ámbito geográfico	129
Gráfico 5.13	Mujeres de 12 a 24 años de edad por edad de la persona con quien tuvo su primera relación sexual, según característica seleccionada	130
Gráfico 5.14	Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad post parto	131
Gráfico 5.15	Mediana y promedio en meses de la amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad postparto	131

CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD

Gráfico 6.1	Preferencias de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas.....	135
Gráfico 6.2	Preferencia de fecundidad de mujeres en 15 a 49 años de edad actualmente unidas, según área de residencia.....	136
Gráfico 6.3	Deseo de tener más hijas o hijos en mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia	136
Gráfico 6.4	Preferencia de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas, según autoidentificación étnica y lengua materna	137
Gráfico 6.5	Componentes de la necesidad insatisfecha de planificación familiar	139
Gráfico 6.6	Mujeres de 15 a 49 años de edad con necesidad insatisfecha de planificación familiar.....	139
Gráfico 6.7	Mujeres de 15 a 49 años de edad con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia.....	140
Gráfico 6.8	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según región natural	140
Gráfico 6.9	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia.....	140
Gráfico 6.10	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según autoidentificación étnica y lengua materna	141
Gráfico 6.11	Planificación de la fecundidad, según orden de nacimiento	142
Gráfico 6.12	Fecundidad observada y deseada, según ámbito geográfico.....	143

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA.....

Gráfico 7.1	Atención prenatal por un profesional de salud calificado (Medico, Obstetra y enfermera).....	152
Gráfico 7.2	Atención prenatal por un profesional de salud calificado (Medico, Obstetra y enfermera), según área de residencia.....	152
Gráfico 7.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por atención prenatal de profesional de salud calificado.....	153
Gráfico 7.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad por atención prenatal de profesional de salud calificado, según área de residencia.....	153
Gráfico 7.5	Mujeres de 15 a 49 años de edad por atención prenatal de profesional de salud calificado, según región natural	154
Gráfico 7.6	Número de atenciones prenatales para el último nacimiento de los últimos cinco años que precedieron a la encuesta	154

Gráfico 7.7	Número de atenciones prenatales para el último nacimiento de los últimos cinco años que precedieron a la encuesta, según área de residencia.....	155
Gráfico 7.8	Meses de embarazo a la primera atención para el último nacimiento de los últimos cinco años anteriores a la encuesta, según área de residencia.....	155
Gráfico 7.9	Actividades de la atención prenatal de las madres para el último nacido vivo, en los últimos cinco años.....	156
Gráfico 7.10	Mujeres de 15 a 49 años de edad que recibieron vacunas contra el tétano neonatal en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta.....	159
Gráfico 7.11	Mujeres de 15 a 49 años de edad que recibieron vacunas contra el tétano neonatal en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta, según ámbito geográfico.....	159
Gráfico 7.12	Parto de menores de cinco años de edad por persona que participó en la atención.....	160
Gráfico 7.13	Parto institucional.....	163
Gráfico 7.14	Parto institucional, según área de residencia.....	163
Gráfico 7.15	Nacimientos por cesárea 1/.....	164
Gráfico 7.16	Nacimientos por cesárea 1/, según área de residencia.....	164
Gráfico 7.17	Mujeres de 15 a 49 años de edad por momento del primer control postnatal para el nacimiento más reciente de los cinco años que precedieron a la encuesta.....	169
Gráfico 7.18	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primer control postnatal antes de las cuatro horas, según ámbito geográfico.....	170
Gráfico 7.19	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primer control postnatal antes de las cuatro horas, según orden de nacimiento y quintil de riqueza.....	170
Gráfico 7.20	Persona que realizó el primer control postnatal después del nacimiento más reciente de los cinco años que precedieron a la encuesta.....	173
Gráfico 7.21	Momento del primer control postnatal para el nacimiento más reciente que no nació en un establecimiento de salud en los cinco años que precedieron a la encuesta.....	173
Gráfico 7.22	Mujeres de 15 a 49 años de edad por momento del primer control postnatal (antes de las cuatro horas) para el nacimiento más reciente que no nació en un establecimiento de salud, según ámbito geográfico.....	174
Gráfico 7.23	Persona que realizó el primer control postnatal a la madre (mujeres 15 a 49 años de edad) después del nacimiento más reciente que no ocurrió en un establecimiento de salud.....	174
Gráfico 7.24	Problemas en el acceso a los servicios de salud cuando las mujeres de 15 a 49 años de edad están enfermas, según motivos específicos.....	175
CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL.....		177
Gráfico 8.1	Peso al nacer de nacidas y nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta.....	179
Gráfico 8.2	Peso al nacer de nacidas y nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta, según ámbito geográfico.....	180
Gráfico 8.3	Tamaño al nacer nacidas y nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta.....	180
Gráfico 8.4	Niñas y niños menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación Directiva sanitaria NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.....	183

Gráfico 8.5	Niñas y niños menores de 24 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación, Directiva sanitaria NTSN°141-MINSA/2018/DGIESP	184
Gráfico 8.6	Niñas y niños menores de 36 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación, Directiva sanitaria NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP	191
Gráfico 8.7	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niñas y niños menores de cinco años de edad.....	192
Gráfico 8.8	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niñas y niños menores de cinco años de edad, según área de residencia	193
Gráfico 8.9	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niñas y niños menores de cinco años de edad, según edad en meses.....	193
Gráfico 8.10	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niñas y niños menores de cinco años de edad, según característica seleccionada.....	194
Gráfico 8.11	Niñas y niños menores de cinco años de edad con síntomas de (IRA) que buscaron tratamiento de un proveedor de salud, según edad en meses.....	194
Gráfico 8.12	Niñas y niños menores de cinco años de edad con síntomas de (IRA) que recibieron antibióticos, según ámbito geográfico.....	195
Gráfico 8.13	Prevalencia de diarrea en niñas y niños menores de cinco años de edad.....	195
Gráfico 8.14	Prevalencia de diarrea en niñas y niños menores de cinco años de edad, según área de residencia	196
Gráfico 8.15	Prevalencia de diarrea en niñas y niños menores de cinco años de edad, según sexo y edad en meses.....	196
Gráfico 8.16	Administración de líquidos y sólidos en niñas y niños menores de cinco años de edad que tuvieron diarrea.....	201
Gráfico 8.17	Conocimiento de sales de rehidratación oral (SRO) de madres con nacimientos en los últimos cinco años	202
Gráfico 8.18	Formas de eliminación de las deposiciones de la hija o hijo menor cinco años de edad	202

CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) DE NIÑAS Y NIÑOS Y NUTRICIÓN DE MUJERES.....

Gráfico 9.1	Lactancia materna inicial y alimentación suplementaria de niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.....	206
Gráfico 9.2	Lactancia materna inicial y alimentación suplementaria de niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta, según área de residencia	206
Gráfico 9.3	Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia materna,.....	207
Gráfico 9.4	Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según área de residencia	207
Gráfico 9.5	Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según característica seleccionada.....	208
Gráfico 9.6	Niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad que consumieron alimentos ricos en vitamina A y hierro durante las últimas 24 horas, según edad en meses.....	211

Gráfico 9.7	Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días.....	212
Gráfico 9.8	Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días, según área de residencia.....	212
Gráfico 9.9	Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días, según autoidentificación étnica y lengua materna	215
Gráfico 9.10	Anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad.....	217
Gráfico 9.11	Anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia.....	217
Gráfico 9.12	Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad.....	218
Gráfico 9.13	Anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según área de residencia.....	218
Gráfico 9.14	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad	223
Gráfico 9.15	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	223
Gráfico 9.16	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según característica seleccionada.....	224
Gráfico 9.17	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna	224
Gráfico 9.18	Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica, (patrón OMS).....	228
Gráfico 9.19	Evolución de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (patrón OMS) según área de residencia	228
Gráfico 9.20	Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (patrón OMS) según característica seleccionada	231
Gráfico 9.21	Niñas y niños entre 9 y 12 meses de edad que tiene una adecuada interacción madre-hija/o como precursor del apego seguro, según característica seleccionada	232
Gráfico 9.22	Madres de niñas y niños entre 9 y 12 meses de edad que responde de manera inmediata y adecuada al llanto de su hija/o, según característica seleccionada.....	232
Gráfico 9.23	Niñas y niños de 9 a 12 meses con comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo apropiada para su edad, según características seleccionada.....	233
Gráfico 9.24	Madres de niñas y niños entre 9 y 18 meses de edad que verbaliza las acciones que realiza con su hija/o mientras las desarrolla, según característica seleccionada	233
Gráfico 9.25	Niñas y niños de 12 a 18 meses que camina por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr el equilibrio, según característica seleccionada.....	234
Gráfico 9.26	Talla promedio de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	235
Gráfico 9.27	Estado nutricional de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según Índice de masa corporal IMC	236
CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS		237
Gráfico 10.1	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según área de residencia	240
Gráfico 10.2	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según autoidentificación étnica y lengua materna	243
Gráfico 10.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo, según área de residencia	244

Gráfico 10.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo, según autoidentificación étnica y lengua materna	245
Gráfico 10.5	Mujeres de 15 a 49 años de edad que conocen de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas	246
Gráfico 10.6	Mujeres de 15 a 49 años de edad que conocen de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas, según área de residencia.....	246
Gráfico 10.7	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según autoidentificación étnica y lengua materna	249
Gráfico 10.8	Uso del condón en los últimos 12 meses por tipo de compañero, según característica seleccionada.....	250

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS.....251

Gráfico 11.1	Violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según formas de violencia.....	254
Gráfico 11.2	Violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia	257
Gráfico 11.3	Violencia psicológica y/o verbal, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según autoidentificación étnica y lengua materna	257
Gráfico 11.4	Violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses	258
Gráfico 11.5	Violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses, según característica seleccionada	258
Gráfico 11.6	Resultado de la violencia física	263
Gráfico 11.7	Violencia física ejercida por el esposo o compañero bajo los efectos del licor/drogas o ambas, según característica seleccionada.....	264
Gráfico 11.8	Búsqueda de ayuda en personas cercanas cuando fueron maltratadas físicamente.....	264
Gráfico 11.9	Búsqueda de ayuda en alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente	267
Gráfico 11.10	Razones para no buscar ayuda cuando fueron maltratadas físicamente.....	268
Gráfico 11.11	Personas que corrigen a las niñas y niños de 1 a 5 años de edad en el hogar	269
Gráfico 11.12	Principales formas que utilizan el padre y la madre cuando corrigen a sus hijas/os de 1 a 5 años de edad.....	270

CAPÍTULO 12: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.....271

Gráfico 12.1	Desnutrición crónica entre las niñas y niños menores de 5 años de edad, según sexo.....	274
Gráfico 12.2	Desnutrición crónica entre las niñas y niños menores de 5 años, según área de residencia.....	274
Gráfico 12.3	Desnutrición crónica entre las niñas y niños menores de 5 años de edad, según nivel de educación de la madre.....	275
Gráfico 12.4	Índice de mortalidad materna	276
Gráfico 12.5	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según área de residencia	277
Gráfico 12.6	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según región natural	278
Gráfico 12.7	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según nivel de educación	279

Gráfico 12.8	Mujeres de 15 a 49 años de edad que practican la planificación familiar con métodos modernos, según área de residencia.....	280
Gráfico 12.9	Mujeres de 15 a 49 años que practican la planificación familiar con métodos modernos, según nivel de educación.....	281
Gráfico 12.10	Tasa de fecundidad 1/ adolescente de 15 a 19 años de edad, según área de residencia.....	282
Gráfico 12.11	Mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia física y sexual, infligida por el esposo o conviviente en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, según área de residencia.....	283
Gráfico 12.12	Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según sexo.....	284
Gráfico 12.13	Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según región natural.....	284
Gráfico 12.14	Personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente cigarrillos, según sexo.....	285
Gráfico 12.15	Personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente cigarrillos, según región natural.....	285

Lista de Mapas

	Pág.
CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN	55
Mapa 1.1 Mediana de años completos de educación de la población femenina y masculina de seis y más años de edad, según departamento	69
CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES	71
Mapa 2.1 Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) con nivel de educación superior, según departamento	77
Mapa 2.2 Cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) en mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad), según departamento	87
CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD	89
Mapa 3.1 Tasa global de fecundidad, según departamento	95
CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR	103
Mapa 4.1 Uso actual de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres (de 15 a 49 años de edad) actualmente unidas, según departamento	109
Mapa 4.2 Uso actual de métodos anticonceptivos Tradicionales entre las mujeres (de 15 a 49 años de edad) actualmente unidas, según departamento	111
CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD	117
Mapa 5.1 Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25-49 años de edad, según departamento	123
Mapa 5.2 Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según departamento.....	127

CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD 133

Mapa 6.1	Fecundidad deseada para los tres años anteriores a la encuesta, según departamento	145
Mapa 6.2	Fecundidad observada para Los tres años anteriores a la encuesta según departamento	147

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA 149

Mapa 7.1	Gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales, según departamento	157
Mapa 7.2	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) que recibieron dos o más inyecciones contra el tétano durante el último embarazo, según departamento.....	161
Mapa 7.3	Parto Institucional, según departamento.....	165
Mapa 7.4	Nacimientos por cesárea, según departamento.....	167
Mapa 7.5	Partos atendidos por profesional de salud calificado, según departamento.....	171

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 177

Mapa 8.1	Nacimientos con bajo peso al nacer(<2.5kg), según departamento.....	181
Mapa 8.2	Niñas y niños menores de 12 meses con todas sus vacunas de acuerdo a su edad, según departamento, (según esquema de vacunación N°141-MINSA/2018/DGIESP)	185
Mapa 8.3	Niñas y niños menores de 24 meses de edad con todas sus vacunas de acuerdo a su edad, según departamento (según esquema de vacunación N°141-MINSA/2018/DGIESP)	187
Mapa 8.4	Niñas y niños menores de 36 meses con todas sus vacunas de acuerdo a su edad según departamento (según esquema de vacunación N°141-MINSA/2018/DGIESP)	189
Mapa 8.5	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niñas y niños menores de cinco años de edad, según departamento.....	197
Mapa 8.6	Prevalencia de diarrea en niñas y niños menores de cinco años de edad, según departamento.....	199

**CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)
DE NIÑAS Y NIÑOS Y NUTRICION DE MUJERES** 203

Mapa 9.1	Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según departamento	209
Mapa 9.2	Niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días, según departamento.....	213
Mapa 9.3	Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según departamento.....	219
Mapa 9.4	Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según departamento.....	221

Mapa 9.5	Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según departamento.....	225
Mapa 9.6	Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (PATRON OMS), según departamento.....	229
CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DEL VIH E ITS		237
Mapa 10.1	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) por conocimiento de 2 formas específicas para evitar el VIH, según departamento	241
Mapa 10.2	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) que no conocen las infecciones de transmisión sexual (ITS), según departamento	247
CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS		251
Mapa 11.1	Violencia familiar contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento.....	255
Mapa 11.2	Violencia psicológica y/o verbal (mujeres de 15 a 49 años de edad) ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento	259
Mapa 11.3	Violencia física y/o sexual (mujeres de 15 a 49 años de edad) ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento.....	261
Mapa 11.4	Violencia familiar contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercida en los últimos 12 meses por el esposo o compañero, según departamento.....	265

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
POBLACIÓN DE LA MUESTRA																
Mujeres de 15 a 49 años de edad	24 213	22 946	22 517	23 888	22 919	24 872	35 766	33 135	33 168	34 875	33 366	32 059	33 086	32 161	-	-
Área urbana	18 050	16 924	16 802	17 866	17 644	19 366	28 380	26 353	26 736	28 680	27 564	25 658	26 982	26 307	-	-
Área rural	6 162	6 022	5 715	6 022	5 276	5 506	7 386	6 782	6 432	6 195	5 802	6 401	6 104	5 854	-	-
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta	9 305	8 484	8 426	8 804	8 182	8 981	13 112	12 201	11 312	10 689	9 746	9 490	9 604	9 302	-	-
Área urbana	5 994	5 447	5 506	5 773	5 585	6 315	9 620	8 906	8 334	7 917	7 198	7 170	7 237	6 954	-	-
Área rural	3 311	3 037	2 920	3 031	2 597	2 666	3 492	3 295	2 978	2 772	2 548	2 321	2 367	2 348	-	-
Sobrevivientes menores de cinco años de edad	9 088	8 331	8 276	8 651	8 024	8 825	11 521	12 020	11 087	10 528	9 612	9 437	9 429	9 111	-	-
Área urbana	5 680	5 370	5 439	5 679	5 484	6 230	8 317	8 785	8 180	7 818	7 115	7 067	7 109	6 819	-	-
Área rural	3 208	2 961	2 837	2 972	2 541	2 595	3 204	3 235	2 907	2 710	2 497	2 280	2 319	2 292	-	-
Niñas y niños vivos de 12 a 23 meses de edad	1 809	1 725	1 612	1 725	1 590	1 840	2 381	2 400	2 393	2 078	1 927	1 717	1 898	1 741	-	-
Niñas y niños vivos de 24 a 35 meses de edad	1 691	1 678	1 831	1 778	1 580	1 692	2 474	2 552	2 275	2 137	1 948	2 042	1 840	1 847	-	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)																
Viviendas con luz eléctrica	82,4	85,2	87,4	89,2	91,2	91,4	92,9	93,8	95,2	95,3	95,7	96,1	96,1	96,2	0,1	*
Área urbana	96,1	96,8	97,6	98,2	98,3	98,1	98,2	98,6	98,9	98,7	99,2	98,7	98,6	98,8	0,2	*
Área rural	54,3	60,3	64,6	69,6	72,9	74,2	77,6	80,1	83,5	83,6	83,9	87,2	87,5	87,2	-0,3	*
Viviendas con agua potable ^{1/}	77,2	76,5	77,1	78,9	79,9	81,7	81,3	80,3	80,4	80,3	80,5	82,8	79,1	77,9	-1,2	*
Área urbana ^{1/}	85,5	82,5	82,6	85,0	84,3	86,5	85,4	83,8	83,2	81,9	82,7	84,8	80,2	79,0	-1,2	*
Área rural ^{1/}	60,1	63,7	64,7	65,7	68,7	69,0	69,6	70,4	71,1	74,5	73,0	75,9	75,6	74,0	-1,6	*
Viviendas con servicio de desagüe ^{2/}	55,7	56,3	58,4	59,3	64,6	66,1	66,9	68,3	71,3	72,1	73,0	73,8	70,6	71,8	1,2	*
Área urbana ^{2/}	77,9	77,2	79,0	81,0	83,6	84,8	84,6	85,7	87,2	87,3	88,2	87,9	84,7	85,8	1,1	*
Área rural ^{2/}	9,8	11,1	12,5	12,7	16,0	17,7	15,5	17,8	20,0	20,5	21,4	25,5	20,7	22,5	1,8	*
Mujeres en edad fértil con secundaria o más	74,0	73,7	75,2	75,2	77,3	79,2	79,0	81,0	82,0	82,5	84,1	84,9	84,6	85,1	0,5	*
Área urbana	85,2	84,8	86,2	85,3	86,3	86,1	87,0	88,9	89,3	89,2	90,5	91,1	90,2	90,6	0,4	*
Área rural	41,6	42,8	42,5	45,2	47,1	47,7	48,0	49,9	52,0	51,9	53,9	60,0	60,0	60,5	0,5	*
Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	51,0	56,9	59,5	57,0	62,8	66,6	73,0	74,9	74,7	73,6	72,5	76,7	78,7	83,7	5,0	***
Área urbana	47,0	51,4	53,7	53,2	58,8	65,1	70,0	72,2	72,2	70,9	69,5	73,9	76,4	81,8	5,4	***
Área rural	62,7	72,1	76,3	68,4	76,1	80,7	84,4	85,3	85,2	86,2	86,5	88,0	88,9	92,3	3,4	***
Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud (SIS)	27,4	33,6	33,8	31,5	35,9	40,6	44,5	46,7	45,5	44,5	43,9	51,1	55,4	60,6	5,2	***
Área urbana	17,1	21,6	21,2	21,1	25,9	31,0	35,9	38,4	37,6	37,1	36,2	43,4	49,1	54,7	5,6	***
Área rural	57,8	67,2	70,8	62,5	69,4	74,2	77,8	79,0	78,2	78,8	80,1	82,2	83,3	87,2	3,9	***

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Test de diferencia de medias 2022 / 2021				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022		
	Diferencia 2022 / 2021																
FECUNDIDAD																	
Tasa Global de Fecundidad³³	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	-0,1
Área urbana	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3	2,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	-0,1
Área rural	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3,0	2,5	2,7	2,8	2,7	2,8	0,1
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,0	2,9	-	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	-
Área urbana	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-
Área rural	5,2	5,0	5,0	4,9	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3	-	4,0	4,1	3,8	4,1	3,8	-
OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD (Porcentaje)																	
Mujeres actualmente unidas	57,1	56,8	56,3	57,0	56,6	56,7	57,9	57,5	56,6	55,5	55,2	52,8	53,5	53,4	53,5	53,4	-
Área urbana	53,3	53,6	52,2	53,4	53,1	53,5	54,8	54,2	53,5	52,4	52,1	49,9	50,8	50,3	50,8	50,3	-
Área rural	68,2	66,1	68,3	67,8	68,1	67,9	69,5	69,9	69,6	69,7	70,0	64,6	65,7	67,2	65,7	67,2	-
Mujeres que han estado unidas alguna vez	66,6	67,3	67,0	67,2	67,7	67,8	69,6	68,7	69,3	68,4	68,6	65,7	68,5	68,3	68,5	68,3	-
Área urbana	63,5	65,1	64,1	64,7	65,3	65,5	67,7	66,4	67,2	66,1	66,5	64,0	67,0	66,6	67,0	66,6	-
Área rural	75,6	73,8	75,4	74,5	75,4	76,0	76,6	77,7	77,7	78,4	78,2	73,1	75,7	76,4	75,7	76,4	-
Mujeres de 25-49 años de edad																	
Edad mediana a la primera unión	21,8	21,5	21,6	21,6	21,6	21,8	21,9	22,1	22,0	22,1	22,2	22,2	21,9	21,9	21,9	21,9	-
Área urbana	22,9	22,3	22,6	22,4	22,4	22,7	22,7	22,8	22,7	22,9	22,9	23,0	22,6	22,5	22,6	22,5	-
Área rural	19,4	19,7	19,5	19,7	19,5	19,5	19,6	19,6	19,4	19,4	19,5	19,4	19,6	19,5	19,6	19,5	-
Edad mediana al primer nacimiento	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	22,1	22,1	22,2	22,4	22,3	-	22,4	22,2	22,2	22,2	22,2	-
Área urbana	23,0	22,7	22,9	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	23,1	23,0	-	23,2	22,8	22,9	22,8	22,9	-
Área rural	20,0	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	-	20,0	20,0	20,1	20,0	20,1	-
Duración media de la amenorrea postparto (en meses)	10,9	10,8	9,3	9,5	8,9	8,7	10,3	10,8	10,3	10,4	10,3	7,2	9,4	11,0	9,4	11,0	-
Duración media de la abstinencia postparto (en meses)	5,8	5,5	4,2	4,4	4,4	4,1	5,7	5,7	5,3	5,6	5,7	4,1	5,6	6,0	5,6	6,0	-

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año											Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022
PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS																
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:																
Que no desea tener más hijas e hijos (incluyendo mujeres esterilizadas)	63,3	64,0	62,6	62,0	60,5	60,6	59,8	59,7	60,4	61,0	61,2	64,0 a/	63,8	63,8	-	-
Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más	22,3	21,7	22,4	22,8	23,1	22,8	23,5	24,9	25,4	23,5	23,6	23,5 a/	22,1	21,4	-	-
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad																
Área urbana	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3 a/	2,2	2,2	-	-
Área rural	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5 a/	2,5	2,4	-	-
Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)																
Que actualmente usa algún método																
Área urbana	73,2	74,4	75,4	75,5	74,0	74,6	74,6	76,2	75,4	76,3	75,9	77,4	78,1	77,9	-0,1	-
Área rural	74,6	75,2	75,9	75,8	73,9	74,6	74,8	76,4	75,2	76,1	75,8	77,2	78,0	78,2	0,2	-
Que actualmente usa un método moderno																
Área urbana	70,0	72,4	74,2	74,8	74,1	74,8	74,1	75,5	76,0	76,9	76,1	78,0	78,3	77,2	-1,1	-
Área rural	50,0	50,5	51,1	51,8	51,3	52,2	53,3	54,3	54,5	55,0	55,6	55,0	57,0	56,6	-0,4	-
Que actualmente usa un método tradicional																
Área urbana	53,3	53,6	54,2	54,8	53,3	54,1	55,1	56,4	56,6	56,4	57,4	57,1	59,0	57,9	-1,1	-
Área rural	42,3	43,4	44,1	44,7	46,2	46,8	47,6	47,9	47,8	50,3	49,2	48,7	50,1	52,3	2,2	*
Proporción de mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar																
Área urbana	23,2	23,9	24,3	23,7	22,7	22,4	21,3	21,9	20,9	21,3	20,3	22,3	21,1	21,4	0,3	-
Área rural	21,3	21,6	21,7	20,9	20,6	20,4	19,6	20,0	18,6	19,7	18,4	20,1	19,0	20,3	1,3	-
Proporción de mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar																
Área urbana	27,8	29,0	30,1	30,2	27,9	28,0	26,5	27,6	28,1	26,6	26,9	29,3	28,2	24,9	-3,3	***
Área rural	7,2	6,9	6,1	8,2	9,0	8,6	6,5	6,0	6,5	6,3	6,1	6,1 a/	5,5	5,9	-	-
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ																
Tasa de mortalidad neonatal ^{4/}	6,5	6,0	5,5	7,6	8,6	8,1	6,2	5,7	6,4	6,3	5,8	6,5 a/	5,4	5,9	-	-
Tasa de mortalidad infantil ^{4/}	8,7	9,1	7,5	9,6	10,1	10,1	7,5	6,8	6,7	6,1	6,9	4,6 a/	5,7	6,2	-	-
Tasa de mortalidad de menores de cinco años de edad ^{4/}	11	9	8	9	11	(10,0) b/	10	-	10	10	-	8	10	11	1	-
Tasa de mortalidad perinatal ^{5/}	20	17	16	17	16	17	15	-	15	15	-	13	15	17	2	-
	26	23	21	21	21	20	18	-	18	19	-	16	18	20	2	-
	16	13	14	16	17	15	13	-	14	24	-	17	20	22	2	-

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022			
ATENCIÓN MATERNA																			
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: ^{6/}																			
Atención prenatal de un profesional de salud calificado (médico, obstetritz y enfermera) durante el embarazo	94,3	94,7	95,4	96,0	95,9	96,9	97,0	97,6	97,5	98,1	98,2	98,1	98,3	97,8				-0,5	*
Área urbana	97,9	98,1	98,9	98,9	98,9	98,8	99,0	99,0	99,2	99,4	99,4	99,4	99,3	99,1				-0,2	
Área rural	87,1	87,9	88,1	90,0	88,9	91,9	91,3	93,2	92,5	94,1	94,7	93,9	95,0	94,0				-1,0	
Parto institucional	81,3	83,7	84,3	86,0	88,0	89,2	90,7	91,9	93,0	92,7	92,4	94,3	93,2	93,3				0,1	
Área urbana	93,1	94,8	94,8	95,2	96,3	96,0	96,7	97,3	97,7	97,4	96,3	97,6	96,9	97,1				0,2	
Área rural	57,6	62,0	62,6	67,3	68,6	72,0	73,2	76,0	79,1	78,8	80,8	83,9	81,1	81,3				0,2	
Atención del parto en un establecimiento de salud	82,0	84,4	85,1	86,8	88,6	89,5	91,0	92,2	93,2	93,0	92,6	94,6	93,3	93,4				0,1	
Área urbana	93,4	95,1	95,2	95,7	96,8	96,2	96,8	97,4	97,7	97,5	96,4	97,6	97,0	97,2				0,2	
Área rural	59,0	63,7	64,2	68,6	69,8	72,6	74,2	76,8	79,9	79,4	81,3	84,7	81,4	81,6				0,2	
Atención de parto por un profesional de salud calificado (médico, obstetritz y enfermera)	82,5	83,8	85,0	86,7	89,1	89,9	91,6	92,4	93,6	93,7	94,4	95,7	94,9	94,6				-0,3	
Área urbana	94,4	95,0	96,0	95,7	97,3	97,0	97,7	98,2	98,4	98,5	98,6	99,0	98,9	98,6				-0,3	
Área rural	61,0	63,7	64,4	69,6	71,3	73,1	75,0	76,9	80,0	79,8	82,4	85,6	82,5	82,8				0,3	
Nacimientos por cesárea	21,4	20,4	22,9	25,3	26,5	28,6	31,6	31,6	34,2	34,5	34,7	36,3	36,3	36,6				0,3	
Área urbana	29,1	27,1	30,7	32,9	33,5	35,6	38,5	38,4	40,8	41,0	40,9	41,9	42,0	42,5				0,5	
Área rural	7,5	8,4	8,2	10,8	11,5	12,0	12,9	13,2	15,7	15,7	17,1	18,7	19,0	19,3				0,3	
VACUNACIÓN																			
(Segun Esquema de Vacunacion NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP)																			
Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	87,5	73,0	87,9	88,3				-	
Área urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,5	86,9	74,8	88,2	88,8				-	
Área rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,1	89,4	67,8	86,9	87,0				-	
Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad que han recibido vacuna: ^{7/}																			
Tuberculosis (BCG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,4	95,4	93,9	92,2	93,2				-	
Área urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,6	96,2	94,0	92,8	94,3				-	
Área rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,1	93,1	93,9	90,2	90,0				-	

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año											Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022
Difteria, pertussis o tos ferina y tétano (DPT, las tres dosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,6	83,0	76,7	80,5	81,5	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	82,0	76,5	80,6	82,1	-	-
Área urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,0	86,0	77,5	80,1	79,9	-	-
Área rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,8	86,2	79,7	82,7	83,0	-	-
Polio (las tres dosis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,6	86,3	79,9	83,1	84,0	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	86,1	79,1	81,4	79,9	-	-
Área urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6	88,4	82,7	82,9	83,6	-	-
Área rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,3	88,7	81,9	82,9	84,2	-	-
Antisarampionosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,7	87,6	85,2	82,8	81,9	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	60,7	46,3	52,9	55,9	3,1	***
Área urbana 8/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,9	59,6	46,0	52,4	56,0	3,6	***
Área rural 8/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	63,8	47,3	54,3	55,7	1,4	-
Todas las vacunas 8/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área urbana 8/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Área rural 8/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD	14,0	14,9	13,9	12,3	10,9	12,1	12,0	11,5	11,0	10,7	11,5	8,2	9,4	11,7	2,3	***
Porcentaje de niñas y niños con diarrea 9/	14,0	15,2	13,3	12,0	10,6	11,7	11,4	11,4	10,6	10,3	11,1	8,0	9,0	11,2	2,2	***
Área urbana 9/	13,9	14,3	15,0	12,8	11,5	12,9	13,6	11,8	12,2	12,1	12,5	8,9	10,6	13,1	2,5	***
Área rural 9/	32,0	32,2	29,8	30,9	29,5	28,2	32,0	34,6	32,5	33,5	33,6	22,4	31,7	32,3	-	-
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	36,9	36,6	36,3	35,2	33,8	31,6	36,7	38,3	37,2	37,1	38,4	23,8	35,2	35,1	-	-
Área urbana	19,2	23,5	18,7	23,2	20,9	20,7	21,9	24,9	20,8	24,8	21,5	18,5	22,4	25,1	-	-
Área rural	16,0	17,1	16,4	13,9	13,3	16,8	15,1	15,9	14,6	14,4	14,5	4,0	5,5	13,8	8,3	***
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA	14,3	17,2	15,9	12,9	13,6	16,2	14,6	15,6	14,3	13,8	14,2	3,7	4,9	13,3	8,3	***
Área urbana	19,1	17,0	17,6	15,7	12,7	18,3	16,5	16,9	15,4	16,2	15,5	5,1	7,2	15,3	8,1	***
Área rural																

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
	NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)															
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	23,8	23,2	19,5	18,1	17,5	14,6	14,4	13,1	12,9	12,2	12,2	12,1	11,5	11,7	0,2	
Área urbana	14,2	14,1	10,1	10,5	10,3	8,3	9,2	7,9	8,2	7,3	7,6	7,2	6,8	7,1	0,3	
Área rural	40,3	38,8	37,0	31,9	32,3	28,8	27,7	26,5	25,3	25,7	24,5	24,8	24,4	23,9	-0,5	
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	18,3	17,9	15,2	13,5	13,1	10,7	10,2	9,3	9,1	8,8	8,7	-	6,9	7,7	0,8	**
Área urbana	9,9	10,1	7,4	7,3	7,1	5,8	6,1	5,3	5,4	4,9	5,0	-	3,9	4,4	0,5	*
Área rural	32,8	31,3	30,0	24,6	25,3	21,9	20,5	19,5	19,2	19,4	18,3	-	15,2	16,6	1,4	
Niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad con anemia	50,4	50,3	41,6	44,5	46,4	46,8	43,5	43,6	43,6	43,5	40,1	40,0	38,8	42,4	3,6	***
Área urbana	46,8	46,6	37,5	39,9	43,8	42,3	40,5	39,9	40,0	40,9	36,7	36,7	35,3	39,0	3,6	***
Área rural	56,7	56,6	49,6	53,0	51,7	57,5	51,1	53,4	53,3	50,9	49,0	48,4	48,7	51,5	2,9	*
Niñas y niños menores de 6 a 59 meses de edad con anemia	37,2	37,7	30,7	32,9	34,0	35,6	32,6	33,3	34,1	32,8	29,5	29,0	28,4	33,6	5,2	***
Área urbana	33,2	33,0	26,5	28,6	31,1	31,7	29,8	30,1	30,7	30,2	26,4	26,4	25,2	30,3	5,1	***
Área rural	44,1	45,7	38,6	40,7	39,8	44,4	39,7	41,4	43,0	39,6	37,9	35,7	37,5	42,4	4,9	***
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días	11,9	14,8	13,6	14,9	17,6	16,4	19,8	19,3	19,8	21,7	23,3	19,1	24,2	22,8	-	-
Área urbana	10,4	12,8	11,6	13,3	15,2	15,0	18,1	18,6	19,2	20,7	22,6	17,7	23,4	21,5	-	-
Área rural	14,6	18,6	17,5	18,0	22,7	19,9	24,3	21,2	21,7	24,8	25,3	23,3	26,7	26,9	-	-
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina "A" los últimos seis meses	5,8	9,1	3,9	3,1	3,7	5,7	6,0	3,3	3,2	7,7	6,6	3,4	5,5	7,3	-	-
Área urbana	3,4	4,3	1,7	1,8	1,9	3,7	3,9	2,1	2,1	4,9	4,3	2,4	3,5	5,3	-	-
Área rural	10,2	17,7	8,1	5,6	7,6	10,6	11,5	6,7	6,5	16,1	13,4	6,8	11,9	13,5	-	-

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
	Niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 Kg.)	6,4	7,2	6,5	7,4	7,3	6,0	7,1	7,0	7,3	7,3	6,5			6,6	6,7
Área urbana	6,3	6,7	6,0	6,7	7,1	5,4	7,2	6,7	6,9	7,1	5,8	6,2	6,4	6,2	-0,2	
Área rural	6,5	8,2	7,3	8,8	7,7	7,4	6,9	8,1	8,7	8,3	8,6	8,2	7,7	8,2	0,5	
Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia materna	68,5	68,3	70,6	67,6	72,3	68,4	65,2	69,8	64,2	66,4	65,6	68,4	64,0	65,9	1,9	
Niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados	99,3	97,9	99,3	98,8	97,4	98,8	98,0	98,4	97,8	97,9	98,2	98,0	97,9	98,3	-	
Duración mediana de la lactancia (en meses) 10/	20,8	21,2	20,4	20,1	20,7	21,2	20,4	20,7	21,0	20,6	21,0	20,7	22,4	20,5	-	
NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)																
Mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo	30,3	35,4	40,4	44,7	49,1	47,8	55,4	59,7	61,8	63,8	65,8	66,2	67,9	66,5	-	
Área urbana	32,8	38,8	45,0	48,2	53,0	51,5	58,9	63,5	65,5	67,2	69,0	68,3	70,2	69,3	-	
Área rural	25,3	28,7	30,8	37,5	40,2	38,4	46,0	48,6	51,0	53,4	56,4	59,3	60,6	57,6	-	
Mujeres con anemia	21,0	21,5	17,4	17,7	18,7	21,6	20,7	20,8	21,0	21,1	21,1	20,9	18,8	20,6	1,8	
Área urbana	20,7	20,3	16,8	16,3	18,1	20,8	20,8	21,1	20,9	21,2	21,4	21,1	18,6	20,3	1,8	
Área rural	22,1	24,9	19,3	21,7	20,4	24,3	20,3	19,6	21,1	20,5	19,6	19,5	20,0	21,8	1,8	
Madres con talla menor de 145 cms.	10,4	9,5	9,4	9,5	9,3	8,3	8,5	8,1	7,9	6,8	6,5	6,7	7,7	6,9	-	
Área urbana	8,4	7,6	7,3	7,7	7,6	6,6	7,1	6,8	6,6	5,5	5,2	5,5	6,1	5,9	-	
Área rural	16,0	14,7	15,3	14,8	14,9	14,2	13,9	13,1	13,3	12,9	12,7	12,7	11,3	11,4	-	

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año												Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022		
PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)																		
Con una ITS	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	1,0	0,7	0,7	0,5	1,0	-	-	-	
Área urbana	0,6	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	1,1	0,8	0,8	0,6	1,1	-	-	-	
Área rural	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,4	0,2	0,5	-	-	-	
Con flujo vaginal	12,8	12,9	12,6	12,2	10,7	11,5	11,7	11,6	11,6	10,0	10,4	10,6	9,3	10,4	-	-	-	
Área urbana	13,0	13,3	12,7	12,8	11,0	12,1	11,8	12,0	12,0	10,1	10,6	11,1	9,4	10,5	-	-	-	
Área rural	12,4	11,6	12,3	10,4	9,4	9,4	11,3	10,2	9,9	9,1	9,6	7,9	8,9	9,9	-	-	-	
Úlceras llagas genitales	2,1	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	1,6	1,5	1,0	1,3	1,5	1,2	1,2	-	-	-	
Área urbana	2,4	1,7	1,7	1,9	1,7	2,0	2,2	1,7	1,5	1,0	1,3	1,6	1,2	1,1	-	-	-	
Área rural	1,6	1,7	1,4	1,5	2,0	1,7	1,5	1,3	1,3	1,0	1,2	1,0	1,1	1,3	-	-	-	
VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)																		
Experimentaron violencia psicológica y/o verbal alguna vez por el esposo o compañero	73,0	72,1	70,0	70,6	67,5	69,4	67,4	64,2	61,5	58,9	52,8	50,1 a/	50,8	51,9	1,1	-	-	
Área urbana	73,2	71,6	69,9	70,5	67,5	69,9	67,8	64,4	61,7	59,2	53,7	50,6 a/	51,5	52,5	1,0	-	-	
Área rural	72,6	73,2	70,3	70,8	67,5	68,1	66,1	63,8	60,8	58,2	49,4	48,0 a/	48,5	49,6	1,1	-	-	
Experimentaron violencia física alguna vez por el esposo o compañero	36,2	37,7	38,0	36,4	35,7	32,3	32,0	31,7	30,6	30,7	29,5	27,1 a/	26,7	27,8	1,1	-	-	
Área urbana	38,7	38,5	38,9	37,3	36,4	32,8	32,7	32,6	31,3	31,1	29,7	27,5 a/	26,2	28,2	2,0	*	*	
Área rural	36,9	35,8	36,0	34,2	33,9	30,9	29,9	28,9	28,4	29,4	29,1	25,7 a/	28,6	26,3	-2,3	**	**	

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2022

INDICADOR	Año													Diferencia 2022 / 2021	Test de diferencia de medias 2022 / 2021	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
Experimentaron violencia sexual alguna vez por el esposo o compañero	8,8	8,6	9,3	8,7	8,4	7,9	7,9	6,6	6,5	6,8	7,1	6,0 a/	5,9	6,7	0,8	*
	Área urbana	8,6	8,6	9,4	8,6	8,4	7,7	6,4	6,2	6,8	6,9	6,0 a/	5,5	6,8	1,3	**
	Área rural	9,1	8,6	9,1	9,0	8,5	8,5	7,4	7,4	7,2	7,6	6,0 a/	7,2	6,5	-0,7	
Experimentaron violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por el esposo o compañero	14,2	13,9	13,6	12,9	12,1	12,8	11,7	10,8	10,6	10,9	10,0	8,8 a/	7,6	8,6	1,2	**
	Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	57,1	55,6	55,3	56,7	55,4	50,8	49,1	50,5	52,0	50,9	48,5 a/	48,6	50,4	-	-
	Área urbana	53,7	51,0	52,4	54,0	53,2	47,6	46,9	48,0	49,8	50,3	46,2 a/	47,0	48,9	-	-
Área rural	64,3	66,4	62,4	63,3	61,8	59,8	56,7	59,6	59,6	60,2	53,0	58,0 a/	53,5	55,9	-	-
Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas	20,3	18,1	16,3	16,0	15,1	17,3	16,1	16,0	13,9	14,7	15,7	17,0 a/	14,7	15,5	0,8	
	Área urbana	23,0	20,3	18,1	18,0	16,6	19,0	17,7	14,9	16,0	17,0	18,2 a/	15,8	16,8	1,0	
	Área rural	13,4	12,6	11,7	10,7	10,6	11,8	10,4	10,1	10,1	9,4	10,1	11,1 a/	10,4	10,0	-0,4

Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa (p < 0,10) ** Diferencia altamente significativa (p < 0,05) *** Diferencia muy altamente significativa (p < 0,01).

Comprende entrevistas realizadas a mujeres entre las edades de 15 a 49 años.

- 1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y plómngrifo público.
- 2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.
- 3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.
- 4/ Defunciones por cada 1 000 nacidos vivos para el período de cinco años precedente a la encuesta, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
- 5/ Es la suma del número de mortinatos y muertes neonatales temprana dividida por los embarazos de siete o más meses de duración, para el período de cinco años antes de la encuesta, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.

6/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

7/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

8/ Incluye BCG, tres dosis de Polio, tres dosis de Pentavalente y una dosis de Antisarampión.

8/ Comprende: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis de la vacuna antipoliomielítica, dos dosis de neumococo, dos dosis de sarampión paperas y rubéola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio, una dosis contra el Sarampión.

9/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

10/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

b/ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15,0% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO


1. Características de las Viviendas y la Población

Características de las viviendas

Los diferenciales en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda tienen relación con el nivel de bienestar económico y social de la población. Así, según la ENDES, en el año 2022 los servicios básicos de la vivienda todavía no están disponibles para toda la población. Los menos beneficiados son los hogares de las viviendas rurales, sin embargo, estos servicios han presentado un mayor incremento porcentual que los hogares de las viviendas urbanas, en el periodo analizado.

El 96,2% tuvo acceso a este servicio. Según área de residencia el 98,8% de las viviendas del área urbana contaban con este servicio; en el área rural, un 87,2% disponía de luz eléctrica. En comparación con el año anterior, no se aprecian diferencias importantes.


PERÚ: DISPONIBILIDAD DE LUZ ELÉCTRICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.1.1 del Informe principal de la ENDES 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por otro lado, según la ENDES 2022, el 77,9% de las viviendas se provee de agua por red pública (dentro o fuera de la vivienda, pión/grifo público). En el área urbana, este servicio cubre al 79,0%; mientras que en el área rural al 74,0%. En comparación al año anterior, se aprecia una tendencia a la disminución.

PERÚ: FUENTE DE AGUA PARA BEBE POR RED PÚBLICA 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)




Nota:
 Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
 1/ Comprende Red Pública dentro de la vivienda, Red Pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio y Pilón/grifo público.
 Cuadro base: Cuadro 1.1.1 del Informe principal de la ENDES 2022.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Respecto al servicio sanitario, el 71,9% de las viviendas tienen servicio higiénico conectado a red pública (incluye dentro y/o fuera de la vivienda). Según área de residencia, la proporción de viviendas en el área urbana, que tenían servicio higiénico conectado a red pública fue considerablemente mayor que en el área rural (85,8% y 63,0 %, respectivamente).

El mayor porcentaje de viviendas sin servicio higiénico se presentó en el área rural (14,1%).


PERÚ: ACCESO A SERVICIO SANITARIO DE LAS VIVIENDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022
(Distribución Porcentual)



1/ Incluye: Red pública dentro y fuera de la vivienda
 2/ Incluye: Letrina exclusiva y letrina común
 3/ Incluye: No hay servicio y otro (río, acequia o canal)
 Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad de la Población

Según la ENDES 2022, el 26,7% tiene menos de 15 años, el 63,8% se encuentra entre los 15 y 64 años y un 9,5% cuenta con 65 y más años de edad. En comparación con el año 2021, el porcentaje de la población de 65 y más años de edad, se encuentran ligeramente incrementados.




Cuadro base: Cuadro 1.7 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2. Niveles de educación de las mujeres en edad fértil

El nivel educativo de las mujeres de 15 a 49 años de edad ha mejorado; en el año 2022, el 85,1% tenía educación secundaria o superior (46,8% y 38,3%, respectivamente). En comparación con el año anterior no se aprecian grandes diferencias.



Nota:

Los porcentajes no necesariamente suman el 100% debido al redondeo.


Cuadro base: Cuadro 2.3 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3. Fecundidad

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 1,9 hijas e hijos por mujer para el periodo 2022. Según área de residencia, el área rural muestra una tasa global de fecundidad más alta (2,8 hijas e hijos) que el área urbana (1,7 hijas e hijos).

PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Hijos por mujer)




Nota:
Mujeres de 15 a 49 años de edad.
Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
1/ Tasa Global de Fecundidad (TGF): Promedio de hijas/hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en la Encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo.
Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe principal de la ENDES 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Fecundidad Adolescente

Del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 9,2% ya estuvo alguna vez embarazada; es decir que ya son madres o que están embarazadas por primera vez; según área de residencia, el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas del área rural (18,4%) fue considerablemente mayor respecto del área urbana (6,8%).


PERÚ: ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ EMBARAZADAS 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



1/ Comprende adolescentes de 15 a 19 años de edad que ya son madres o que están embarazadas por primera vez.
Cuadro base: Cuadro 3.14 del Informe principal de la ENDES 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

4. Uso Actual de Métodos de Planificación Familiar

En el año 2022, según la ENDES, el 77,9% de las mujeres actualmente unidas estaban usando algún método anticonceptivo a la fecha de la encuesta. En el área urbana fue 78,2% y en la rural 77,2%.




Cuadro base: Cuadro 4.4 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Uso de Métodos Modernos

El 56,6% de mujeres actualmente unidas estaba usando métodos modernos en el 2022. La proporción de usuarias de este método fue mayor en el área urbana que en el área rural (57,9% frente a 52,3%). El uso de estos métodos ha tendido al incremento en el área rural.



Cuadro base: Cuadro 4.4.1 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


5. Otros determinantes de la fecundidad

Estado conyugal actual

La formación de uniones legales o consensuales constituye un indicador de la exposición al riesgo de embarazo, por lo que tiene implicancia en la fecundidad.

En el año 2022, el 53,4% de las mujeres entrevistadas se encontraba en unión conyugal; 16,7% estaba casada y 36,7% en situación de convivencia. Al comparar estos datos con el 2021, la tendencia disminuye principalmente en las mujeres casadas.

PERÚ: ESTADO CONYUGAL ACTUAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS EN EDAD, 2021 Y 2022
(Distribución Porcentual)



1/ Comprende mujeres separadas, viudas y divorciadas.

Cuadro base: Cuadro 5.1 del Informe principal de la ENDES 2022.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad a la primera unión conyugal

La edad a la primera unión tiene un efecto importante en la fecundidad, porque cuanto más joven forma pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición al riesgo de embarazo y mayor el potencial reproductivo a lo largo de su vida.

La edad mediana a la primera unión en las mujeres de 25 a 49 años fue 21,9 años. Existen diferencias según el área de residencia, en el área urbana fue más tarde (22,5 años) que las residentes en el área rural (19,5 años); según región natural, las mujeres residentes en la selva inician su unión conyugal a una edad más temprana (19,7 años).

PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA UNIÓN DE LAS MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2021 Y 2022
(Edad)



Cuadro base: Cuadro 5.9 del Informe principal de la ENDES 2022.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad a la primera relación sexual

La primera relación sexual ocurre antes que la unión conyugal. El inicio temprano tiene mucha importancia principalmente para las adolescentes porque se convierte en un riesgo potencial para embarazos no deseados, abortos y contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Según la ENDES 2022, la edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres de 25 a 49 fue 18,4 años. La primera relación sexual fue más temprana en el área rural (17,6 años) que en el área urbana (18,5 años). Según región natural, las mujeres residentes en la selva inician su actividad sexual a una edad más temprana (17,0 años).

PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2021 Y 2022
(Edad)



Cuadro base: Cuadro 5.12 del Informe principal de la ENDES 2021.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

6. Salud Materna e Infantil

Atención prenatal

En el embarazo del último nacimiento, el 97,8% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, tuvo algún control prenatal por personal de salud calificado (médico, obstetra y enfermera). Al comparar con el año anterior, tendió a la disminución (98,3%). Según persona que proporcionó la atención prenatal, el 83,8% recibió atención por parte de la o el obstetra, el 32,0% por parte de médico y por enfermera el 7,2%.

PERÚ: NACIMIENTOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PRENATAL DE UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO 1/, SEGÚN PERSONA QUE PROPORCIONÓ LA ATENCIÓN PRENATAL, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:

Se refiere a Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta.

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Profesional de salud calificado: incluye médico, obstetra, enfermera.


2/ Técnico en enfermería/Promotor de salud, Comadrona/Partera, otro.

Cuadro base: Cuando 8.2.del informe Principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según área de residencia, fue mayor la atención recibida por un profesional de la salud calificado en área urbana (99,1%) en comparación con la recibida en área rural que fue 94,0%. En comparación con año anterior, se aprecia la misma tendencia entre ambos tipos de áreas.

PERÚ: NACIMIENTOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PRENATAL DE UN PROFESIONAL, DE SALUD CALIFICADO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)

**Nota:**

Se refiere a Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta.


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Cuadro base: Cuando 8.2.2 del informe Principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El control temprano, durante el primer trimestre de gestación, es muy importante en el cuidado de la salud de la madre y el niño, al respecto el 79,0% de gestantes recibió control de su embarazo en los tres primeros meses de gestación. Según área de residencia, fue mayor en 7,2 puntos porcentuales en el área urbana en relación al área rural (80,7% y 73,5%, respectivamente).

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON SU PRIMERA ATENCIÓN PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2022
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuando 8.3 del informe Principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Parto Institucional

Según la ENDES 2022, la proporción de partos institucionales fue 93,3%. Según área de residencia, se observa una diferencia de 15,8 puntos porcentuales entre el área urbana y rural (97,1% frente a 81,3%, respectivamente). En comparación el año anterior, se mantiene la misma tendencia.

PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL^{1/}, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)




Nota:
La estimación se refiere al último nacimiento de la mujer de 15 a 49 años de edad, en el período de 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose los nacimientos en el mes de la entrevista.
1/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.
Cuadro base: Cuando 8.9.1 del informe Principal de la ENDES 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Control Postnatal

El 79,9% de mujeres tuvo un primer control postnatal dentro de las primeras cuatro horas después del parto. Según área de residencia, en el área urbana, el 80,5% de las mujeres tuvieron un control antes de las cuatro horas postparto; mientras que en el área rural fue el 78,1%.

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON SU PRIMER CONTROL POSTNATAL ANTES DE LAS CUATRO HORAS DESPUÉS DEL PARTO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuando 8.13 del informe Principal de la ENDES 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

7. Salud Infantil

Bajo peso al nacer

Entre las niñas y niños que fueron pesados al nacer, un 6,7% pesó menos de 2,5 Kg. Por área de residencia la prevalencia de bajo peso al nacer fue mayor en el área rural (8,2%) en comparación al área urbana (6,2%).

PERÚ: BAJO PESO AL NACER DE NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS VIVOS EN LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:

Información basada en la tarjeta de salud o por información de la madre (mujeres de 15 a 49 años de edad).

Cuadro base: Cuadro 9.2 del informe Principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


VACUNACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD

Según Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP

En el año 2022, el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con todas las vacunas completas para su edad alcanzó un 55,9%. En comparación al año 2021 se observa un incremento de 3,0 puntos porcentuales (52,9%).

Considerando la tercera dosis, más del 80,0% de niñas y niños menores de 36 meses fueron protegidos con la Pentavalente el 81,5% y con la Polio el 83,0%.

**PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD,
SEGÚN TIPO DE VACUNA RECIBIDA, 2021 Y 2022
(Según Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)
(Porcentaje)**



1/ "Todas las vacunas" comprende: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis de la vacuna Antipoliomielítica, dos dosis de Rotavirus, tres dosis de Neumococo, dos dosis de Sarampión paperas y rubeola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio, una dosis contra el Sarampión.


Cuadro base: Cuadro 9.10 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

En el año 2022, el porcentaje de niñas y niños con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) durante las dos semanas precedentes a la encuesta fue de 13,8%, porcentaje que aumentó significativamente, en comparación con el año anterior que fue de 5,5%. Según área de residencia, la prevalencia fue mayor en el área rural (15,3%) en comparación con el área urbana (13,3%).

PERÚ: PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, DURANTE LAS DOS SEMANAS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$). Cuadro base: Cuadro 9.12 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

En el 2022, la prevalencia de diarrea entre niñas y niños menores de cinco años de edad alcanzó 11,7%, mostrando un aumento de 2.3 p.p. con respecto al 2021. Fue mayor en el área rural en comparación con el área urbana (13,1% y 11,2%, respectivamente).

PERÚ: PREVALENCIA DE DIARREA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DURANTE LAS DOS SEMANAS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$). Cuadro base: Cuadro 9.16 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

8. Anemia en niñas y niños

Según la ENDES, al 42,4% de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad residentes en Perú, se les detectó anemia en el año 2022; según área de residencia, la anemia fue más frecuente entre niñas y niños residentes en el área rural (51,5%) que en el área urbana (39,0%).

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES CON ANEMIA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
Cuadro base: Cuadro 10.14.3 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Anemia en mujeres

El 20,6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecía de algún tipo de anemia; según área de residencia, el porcentaje fue ligeramente mayor en el área rural (21,8%) que en el área urbana (20,3%).

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2021 Y 2022
(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
Cuadro base: Cuadro 10.16 del Informe principal de la ENDES 2022.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Desnutrición crónica

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución muestra la mejora de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las niñas y niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo.

De acuerdo con el patrón de la OMS, en el año 2022 la desnutrición crónica afectó al 11,7% de niñas y niños menores de cinco años de edad; sin variación significativa si se compara con el año anterior (11,5%).

Según área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas y niños del área rural (23,9%), es decir, 16,8 puntos porcentuales más que en el área urbana (7,1%).



Cuadro base: Cuadro 10.18.1 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


9. Formas específicas de evitar el contagio del VIH

En el año 2022, el 4,4% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos consideradas de importancia programática para evitar el VIH.

Sobre el conocimiento de las formas específicas para evitar el VIH, el 84,5% de entrevistadas se refirió al uso del condón, y el 85,4% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”.

PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN FORMAS ESPECÍFICAS DE EVITAR EL CONTAGIO, 2021 Y 2022

(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Cuadro base: Cuadro 11.2 del Informe principal de la ENDES 2022.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo

Entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 64,6% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto; un 23,0% refirió que puede darse con la lactancia. Si se compara con el año anterior, ambos porcentajes tendieron al aumento.

PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH DE MADRE A HIJA O HIJO, 2021 Y 2022

(Porcentaje)



Nota:


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Cuadro base: Cuadro 11.4 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

10. Violencia contra Mujeres, Niñas y Niños


El 55,7% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. Entre las formas de violencia, la psicológica y/o verbal fue mayor (51,9%), la violencia física alcanzó el 27,8% y la violencia sexual el 6,7%. En comparación con el año anterior, estos porcentajes tendieron al aumento.



Cuadro base: Cuadro 12.1.2 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En los últimos 12 meses, el 8,6% de las mujeres sufrieron violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero, respuesta que tendió al aumento respecto al año 2021 (7,6%). Entre estas formas de violencia, destaca la violencia física (8,1%). La violencia sexual es menos declarada (2,2%).



Nota:

Mujeres de 15 a 49 años de edad que han sido seleccionadas para la encuesta.

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Cuadro base: Cuadro 12.4 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Violencia a niñas y niños

Entre las formas para corregir a sus hijas e hijos de 1 a 5 años de edad, tanto el padre como la madre, según la respuesta de las entrevistadas, tienen mayor propensión a usar la reprimenda verbal (60,5% y 60,7%, respectivamente); le sigue, hablar con él o ella y explicar su conducta; 50,1% en el padre y 48,6% en la madre.

PERÚ: PRINCIPALES FORMAS QUE UTILIZAN EL PADRE Y LA MADRE CUANDO CORRIGEN A SUS HIJAS/OS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD, 2022
(Porcentaje)



Nota:

Mujeres de 15 a 49 años de edad que han sido seleccionadas para la encuesta.

Cuadro base: Cuadro 12.20 y cuadro 12.21 del Informe principal de la ENDES 2022.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.